



MALINA



UNISTART sadrži efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike. Unistart se primenjuje za tretman zemljišta ili u kombinaciji sa zemljišnim herbicidima ili tokom vegetacije kroz sistem kap po kap.




SLAVOL VVL je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Slavol VVL sadrži mikroorganizme, stimulatore rasta koji u procesu fermentacije stvaraju AUKSINE - indol-3-sirćetna kiselina. Primenom Slavola VVL povećava se oplodnja, bolja je obojenost plodova, veći broj zametnutih plodova, veća krupnoća plodova i veći prinosi. Slavol VVL se primenjuje samostalno ili u kombinaciji sa Amiksolom. Može se primenjivati sa pesticidima.



AMIKSOL sadrži 16% slobodnih L – aminokiselina biljnog porekla dobijene mikrobiološkom fermentacijom. Aminokiseline se direktno uključuju u sintezu proteina što utiče na bržu regeneraciju biljaka u uslovima stresa, koji može nastati usled niskih i visokih temperatura, napada bolesti i štetočina, neadekvatnog vodno – vazdušnog režima, oštećenja od grada i sl.

U uslovima dugotrajnog stresa za brži oporavak biljaka preporučujemo da se Amiksol, koji stimuliše sintezu proteina, primeni zajedno sa Slavolom, koji izaziva brže deobe ćelija.



USLUGE ANALIZE ZEMLJIŠTA

- pH zemljišta u vodi i KCl.
- Određivanje sadržaja humusa.
- Određivanje sadržaja ukupnog azota.
- C/N odnos.
- Određivanje lako pristupačnog azota.
- Određivanje sadržaja lako pristupačnog K i P.
- Određivanje sadržaja CaCO_3 .

NA OSNOVU HEMIJSKE ANALIZE ZEMLJIŠTA STRUČNI TIM AGROUNIKA DAJE PREPORUKE ZA:

- * podizanje zasada
- * đubrenje zasada u punom rodu
- * popravku i održavanje plodnosti zemljišta

SADNJA MALINE

UNISTART / SLAVOL VVL

PRIMENA	PROIZVOD	NAČIN PRIMENE
TRETMAN ZEMLJIŠTA	UNISTART	3 l/ha prskati po zemljištu
POTAPANJE SADNICA PRED SADNJU	SLAVOL VVL	u 2 % rastvor Slavola VVL potopiti sadnice i ostaviti da odstoje 30 minuta, može i duže



FOLIJARNA PRIHRANA MALINE

SLAVOL VVL / AMIKSOL

PRIMENA	PROIZVOD	NAČIN PRIMENE
POČETAK LISTANJA	SLAVOL VVL	1 % rastvor Slavola VVL
NA POČETKU I TOKOM CVETANJA	SLAVOL VVL	1 % rastvor Slavola VVL + 0,5 % Amiksol po potrebi
ZAMETANJE PLODOVA	SLAVOL VVL	1 % rastvor Slavola VVL + 0,5 % Amiksol po potrebi
PRED BERBU 15 DANA	SLAVOL VVL	1 % rastvor Slavola VVL + 0,5 % Amiksol po potrebi
PRED SAMU BERBU	SLAVOL VVL	1 % rastvor Slavola VVL + 0,5 % Amiksol po potrebi
NAKON BERBE	SLAVOL VVL	1 % rastvor Slavola VVL + 0,5 % Amiksol po potrebi
REDOVNA PRIHRANA ili STRESNE SITUACIJE (grad, mraz, suša, preterane količine vode)	AMIKSOL	1 % rastvor Amiksola



POČETAK LISTANJA



NA POČETKU I TOKOM CVETANJA



ZAMETANJE PLODOVA



PRED BERBU 15 DANA



PRED SAMU BERBU



NAKON BERBE