

JAGODIČASTO VOĆE


(jagoda, malina, borovnica, kupina)

Slavol VVL se koristi folijarno 5 l/ha u fenofazama.



VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	ПРОИЗВОД	НАЧИН ПРИМЕНЕ
НЕПОСРЕДНО ПРЕ ФОРМИРАЊА БАНКОВА И ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈА	UNISTART	3 l/ha испрскати по земљишту
ПОЧЕТАК ВЕГЕТАТИВНОГ ПОРАСТА (ФОРМИРАЊЕ LISНЕ ROZETE)	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
TOKOM CVETANJA	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
NAKON OPLODNJE-PLOD VELIČINE 2-3 cm	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
PRED BERBU	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
NAKON BERBE ZA KONDICIJU ŽIVICA	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
STRESNI USLOVI (оштећење од града, ниског и високог температуре)	AMIKSOL	Folijarno 2-3 l/ha

VINOVA LOZA



VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	ПРОИЗВОД	НАЧИН ПРИМЕНЕ
ПОЧЕТАК ВЕГЕТАЦИЈЕ	UNISTART	3 l/ha испрскати по земљишту
VIDNO FORMIRANJE CVASTI - PRECVETAVANJE	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
INTEZIVAN PORAST BOBICE	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
FAZA ZATVARANJA GROZDA	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
FAZA ŠARKA	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
STRESNI USLOVI (оштећење од града, ниског и високог температуре)	AMIKSOL	Folijarno 2-3 l/ha
KOMPOSTIRANJE (opalog lišća, grančica od orezivanja)	UNIKER	5 l/ha испрскати по земљишту

SADNICE

(priprema za sadnju i nega u toku prve godine)



VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	ПРОИЗВОД	НАЧИН ПРИМЕНЕ
3-4 МЕСЕЦА ПРЕ САДНЈЕ	UNIKER	-sa стажњаком 5 l/ha по земљишту -sa минералним дубривом пре танђирања 5l/ha
POTAPANJE SADNOG МАТЕРИЈАЛА	SLAVOL VVL	2% rastvor потопiti sadnice i ostaviti 30 minuta da odstoji.
ZALIVANJE POSLE SADNJE	SLAVOL VVL	Zalivanje preostalom količinom rastvora.
FOLIJARNO	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha, више пута у toku vegetacije.



Slavol VVL se koristi folijarno 5 l/ha u fenofazama



agrounik
Nauka posvećena prirodi

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO



22310 Šimanovci, Krnješevačka bb, Tel: 022.481.981; Fax: 022.481.399; Mail: office@agrounik.rs
www.agrounik.rs



Za siguran rod i krupan plod.

SLAVOL VVL sadrži indol – 3 – sirćetnu kiselinu (IAA), - auksin, mikrobiološkog porekla, koristi se za folijarnu prihranu voća (jabučastog, koštičavog, jagodastog), vinove loze, sadnica i kalemova.
Slavol VVL se koristi folijarno 5 l/ha. Slavol VVL pospešuje oplodnjvu, razvoj ploda, smanjuje opadanje pred berbu.



UNISTART sadrži efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike.

Primena Unistarta je u početku vegetacije sa 3 l/ha u kombinaciji sa herbicidima.



AMIKSOL sadrži L-aminokiseline biljnog porekla koje su dobijene(enzimskom) mikrobiološkom hidrolizom. Amiksol sadrži 16% slobodnih aminokiselina. Amiksol se preporučuje kada se biljka nalazi u stanju stresa (usled visoke ili niske temperature, neadekvatnog vodnog režima, poremećene ishrane, oštećenja od grada, štetočina, bolesti). Amiksol se može primenjivati samostalno 2-3 l/ha ili zajedno sa pesticidima.



Njiva spremna za rodna vremena!

UNIKER se koristi u voćarstvu za kompostiranje opalog lišća(opalo lišće isprskati sa 5 l/ha Unikerom i zaorati), grančica od orezivanja i sl. Za pripremanje komposta Uniker se primenjuje na sledeći način:
1.Masu organske materije, (red lišća, zemlje, usitnjenoj granji) – ređati jedno na drugo.
2.Svaki red ponaosob isprskati sa 5% Uniker-om da masa bude vlažna.
3.Poslednji sloj završiti sa zemljom u vidu piramide.

JABUČASTO VOĆE

(jabuka, kruška, mušmula)

Slavol VVL se koristi folijarno 5 l/ha u fenofazama.

PRECVETAVANJE sa 5 l/ha	RAZVOJ PLODA NAKON OPLODNJE (PLOD VELIČINE LEŠNIKA) sa 5 l/ha	NAKON JUNSKOG OPADANJA PLODOVA sa 5 l/ha	PERIOD JUL-AVGUST sa 5 l/ha	10 DANA PRED BERBU sa 5 l/ha

VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	ПРОИЗВОД	НАЧИН ПРИМЕНЕ
ПОЧЕТАК ВЕГЕТАЦИЈЕ	UNISTART	3 l/ha isprskati po zemljištu
PRECVETAVANJE	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
РАЗВОЈ ПЛОДА НАКОН ОПЛОДЊЕ (ПЛОД ВЕЛИЧИНЕ ЛЕШНИКА)	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
НАКОН ЈУНСКОГ ОПАДАЊА	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
ПЕРИОД ЈУЛ-АВГУСТ	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
10 ДАНА ПРЕД БЕРБУ	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
СТРЕСНИ УСЛОВИ (оштећење од града, ниских и високих температура)	AMIKSOL	Folijarno 2-3 l/ha
КОМПОСТИРАЊЕ (опалог лишћа, гранчица од орезивања)	UNIKER	5 l/ha isprskati по земљишту



KOŠTIČAVO VOĆE

(breskva, šljiva, kajsija, višnja, trešnja)

Slavol VVL se koristi folijarno 5 l/ha u fenofazama

PRECVETAVANJE sa 5 l/ha	NAKON ПРОРЕДИВАЊА ПЛОДА (интезиван пораст плода) sa 5 l/ha	PROMENA BOJE – ПОЧЕТАК ЗРЕНЈА sa 5 l/ha	НЕКОЛИКО ДАНА ПРЕД БЕРБУ sa 5 l/ha

VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	ПРОИЗВОД	НАЧИН ПРИМЕНЕ
ПОЧЕТАК ВЕГЕТАЦИЈЕ	UNISTART	3 l/ha isprskati po zemljištu
PRECVETAVANJE	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
НАКОН ПРОРЕДИВАЊА ПЛОДА (ИНТЕЗИВАН ПОРАСТ ПЛОДА)	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
ПРОМЕНА БОЈЕ – ПОЧЕТАК ЗРЕНЈА	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
НЕКОЛИКО ДАНА ПРЕД БЕРБУ	SLAVOL VVL	Folijarno 5 l/ha
СТРЕСНИ УСЛОВИ (оштећење од града, ниских и високих температура)	AMIKSOL	Folijarno 2-3 l/ha
КОМПОСТИРАЊЕ (опалог лишћа, гранчица од орезивања)	UNIKER	5 l/ha isprskati по земљишту

